DNA:n eristäminen hedelmistä

Työn tavoite Työn tavoitteena on tutustua DNA:n rakenteeseen sekä DNA:ta suojaaviin solun osiin. Työssä pyritään ymmärtämään ne biokemialliset perusteet, joiden ansiosta DNA on mahdollista eristää kudosnäytteestä. Työssä opetellaan luonnontieteellistä ajattelutaitoa ja tutkimuksen tekemistä sekä harjoitellaan biologian tutkimusvälineistön käyttöä.

Työn kesto 45-60 min.

Taustatietoa

Kaikkien elävien eliöiden perimä koostuu DNA:sta eli deoksiribonukleiinihaposta. DNA koostuu kahdesta toisiinsa liittyvästä ketjusta eli juosteesta. DNA-juosteen rakenteessa on kolme tärkeää osaa: **sokeri**-, **fosfaatti**- ja **emäsosa**. Emäksiä on neljä erilaista: adeniini (A), guaniini (G), sytosiini (C) ja tymiini (T). Näiden neljän emäksen avulla solun perimään on kirjattu tieto siitä, miten sen pitää toimia eri tilanteissa.



Kuva 1: DNA-juosteen rakenne

DNA:n pakkautuminen pieneen tilaan on hyvin tärkeää, jotta se mahtuisi solun sisälle – esimerkiksi lähes jokaisessa ihmisen solussa on keskimäärin kaksi metriä DNA:ta. DNA ja siinä kiinni olevat proteiinit ovat pakkautuneena solussa rihmamaisena kromatiinina. Solun jakautuessa kromatiini pakkautuu vielä tiiviimmin kromosomeiksi. Jokaisella lajilla on sille tyypillinen määrä kromosomeja, esimerkiksi ihmisellä on 46, tomaatilla 24 kromosomia ja luumulla 48 kromosomia.

DNA säilytetään solussa hyvin suojattuna. Jokaista elävää solua ympäröi fosfolipideistä eli rasvamolekyyleistä muodostuva solukalvo, joka suojaa koko solua ja samalla sen perimää. Kasvisoluja suojaa lisäksi solukalvon ulkopuolella oleva, selluloosasta koostuva soluseinä. Tumallisilla eliöillä, kuten kasveilla, sienillä ja eläimillä, suurin osa solun sisältämästä DNA:sta sijaitsee tumassa. Tuma on soluelin, jonka tehtävänä on säilyttää ja suojata DNA:ta. Tumaa ympäröi suojaava tumakotelo, joka koostuu fosfolipideistä. Tumallisten eliöiden soluissa jonkin verran DNA:ta on myös viherhiukkasissa ja mitokondrioissa.

Tämä teos on lisensoitu Creative Commons Nimeä-JaaSamoin 4.0 Kansainvälinen –lisenssillä. Justus Mutanen & Saana Remula / BioPop-tiedeluokka 2016. Muokannut Salla Merenheimo / BioPop 2019.

Tumattomilla eliöillä, kuten bakteereilla ja arkeoneilla, ei ole tumaa. Näillä eliöillä DNA sijaitsee solukalvon sisäpuolella solulimassa.

DNA-molekyylien sisältämään tiedon avulla solu muokkaa ja kuljettaa aineita, viestii muiden solujen kanssa sekä lisääntyy. DNA:n kohtia, jotka ohjaavat solun toimintaa, kutsutaan geeneiksi. Useimmiten geeni sisältää tiedon tietyn proteiinin valmistamisesta. Proteiineja valmistetaan proteiinisynteesin kautta: aluksi DNA:n sisältämä tieto kopioidaan RNA-molekyyliin, ja varsinainen proteiini kootaan aminohapoista RNA:n sisältämän tiedon perusteella. Proteiinit hoitavat monia solun tehtäviä. Ne välittävät viestejä, kuljettavat aineita, helpottavat kemiallisia reaktioita sekä toimivat rakennusmateriaaleina.



Kuva 2: Kasvisolun rakenne. Pääosa DNA:sta sijaitsee tumassa. Myös viherhiukkasissa ja mitokondrioissa on hieman DNA:ta.

Pohdittavaksi ennen työtä

1. Missä solun osassa DNA sijaitsee?
2. Mitä solun osia pitää hajottaa, jotta DNA pääsisi ulos solusta?
3. Mitä tehtäviä DNA:lla on soluissa?

Työssä tarvittavat välineet

- Tutkittavia hedelmiä (DNA eristyy helposti esimerkiksi avokadoista, kiivistä, mansikoista ja kypsistä banaaneista)
- Minigrip-pusseja
- Dekantterilaseja
- Pasteur-pipettejä
- Mittalaseja
- Koeputkia
- Koeputkitelineitä
- Suppiloita
- Suodatinpaperia
- Nestesaippuaa tai astianpesuainetta

Tämä teos on lisensoitu Creative Commons Nimeä-JaaSamoin 4.0 Kansainvälinen –lisenssillä. Justus Mutanen & Saana Remula / BioPop-tiedeluokka 2016. Muokannut Salla Merenheimo / BioPop 2019.

- Suolaa
- Jääkylmää alkoholia (esim. Marinol tai Sinol)
- Suojavarusteet: suojatakit ja -hanskat

Työturvallisuus

– Työn ajan on suositeltavaa käyttää suojahanskoja ja -takkia.

Työohje

1. Kuori hedelmä ja laita se minigrip-pussiin. Lisää pussiin noin 0,25-1,0 dl vettä hedelmän koosta riippuen.
2. Lisää pussiin loraus nestemäistä saippuaa ja 0,5 tl suolaa.
3. Sulje muovipussi mahdollisimman tiiviisti niin, että sinne ei jää ilmaa. Puristele pussia huolellisesti, kunnes hedelmän rakenne on täysin hajonnut. Älä rutista pussia liikaa, jottei pussiin synny vaahtoa.
4. Inkuboi seosta eli anna seoksen tekeytyä 5-10 minuuttia pussissa. Valmistele tällä väliin suodatinlaitteisto laittamalla suodatinpussi suppiloon ja suppilo koeputkeen. Voit myös vastata työtä koskeviin kysymyksiin tällä välin.
5. Kaada seos suodatinpussiin ja anna suodattua 10-15 minuuttia, tai kunnes suodosta on tarpeeksi muodostamaan koeputkeen vähintään 1 cm korkuinen kerros.
6. Käännä koeputki n. 45 asteen kulmaan ja pipetoi koeputken reunaa pitkin noin sentin paksuinen kerros jääkylmää alkoholia. DNA ja siihen kiinnittyneet proteiinit saostuvat suodoksen ja alkoholin väliselle rajapinnalle.

Pohdittavaksi työn jälkeen

1. Miksi näytteiden joukkoon lisättiin saippualiuosta?
2. Miksi DNA saatiin näkymään, kun seokseen lisättiin alkoholia?
3. DNA:n kanssa saostuu myös monia proteiineja. Ota selvää, millaisia proteiineja DNA:ssa on kiinni ja miten niistä voitaisiin päästä eroon.

Tämä teos on lisensoitu Creative Commons Nimeä-JaaSamoin 4.0 Kansainvälinen –lisenssillä. Justus Mutanen & Saana Remula / BioPop-tiedeluokka 2016. Muokannut Salla Merenheimo / BioPop 2019.